

## 正誤表

『卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライン 2020 年版』第 1 刷 (2020 年 8 月 30 日発行), 第 2 刷 (2020 年 10 月 15 日発行) に誤りがございました。下記のとおり訂正し, お詫び申し上げます。

2020 年 12 月 25 日

金原出版株式会社

## 記

頁	訂正箇所	誤	正
143	12 行目	オラパリブ群 (300mg/日, 1 日 2 回 : 錠剤経口投与)	オラパリブ群 (300mg/回, 1 日 2 回 : 錠剤経口投与)
143	18 行目	オラパリブ群 (400mg/日, 1 日 2 回 : カプセル経口投与)	オラパリブ群 (400mg/回, 1 日 2 回 : カプセル経口投与)

以上

正誤表

『卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライン 2020 年版』第 1 刷 (2020 年 8 月 30 日発行), 第 2 刷 (2020 年 10 月 15 日発行) にわかりにくい記述がございました。下記のとおり追記します。

2020 年 12 月 25 日

金原出版株式会社

記

139 頁 表 13

追記前	表 13 再発卵巣癌の化学療法(薬剤名は五十音順)			
	薬剤	投与量	投与スケジュール	奏効率(%)
	イリノテカン <sup>7)</sup>	100 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1, 8, 15 (4 週毎)	29
	エトポシド <sup>13)</sup>	50 mg/m <sup>2</sup>	経口, day 1~21 (4 週毎)	27
	ゲムシタピン <sup>5,6)</sup>	1,000 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1, 8, 15 (4 週毎)	6~15
	トポテカン(ノギテカン) <sup>4,10)</sup>	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1~5 (3 週毎)	12~18
	トポテカン(ノギテカン) <sup>15)</sup>	1.25 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1~5 (3 週毎)	17
	ドセタキセル <sup>8)</sup>	70 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1 (3 週毎)	22
	パクリタキセル <sup>4,9)</sup>	180 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1 (3 週毎)	10~30
	パクリタキセル <sup>11,12)</sup>	80 mg/m <sup>2</sup>	静注(毎週)	25~45
	パクリタキセル <sup>15)</sup>	80 mg/m <sup>2</sup>	静注(毎週)	53
	リポソーム化ドキシソルビシン <sup>3,5,6)</sup>	40~50 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1 (4 週毎)	10~20
	リポソーム化ドキシソルビシン <sup>15)</sup>	40 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1 (4 週毎)	14
	ベバシズマブ併用 <sup>15)</sup>	15 mg/kg	静注, day 1 (3 週毎)	
	ベバシズマブ併用 <sup>15)</sup>	10 mg/kg	静注, day 1, 15 (4 週毎)	
追記後 (赤い囲み部分を追記)	表 13 再発卵巣癌の化学療法(薬剤名は五十音順)			
	薬剤	投与量	投与スケジュール	奏効率(%)
	イリノテカン <sup>7)</sup>	100 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1, 8, 15 (4 週毎)	29
	エトポシド <sup>13)</sup>	50 mg/m <sup>2</sup>	経口, day 1~21 (4 週毎)	27
	ゲムシタピン <sup>5,6)</sup>	1,000 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1, 8, 15 (4 週毎)	6~15
	トポテカン(ノギテカン) <sup>4,10)</sup>	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1~5 (3 週毎)	12~18
	トポテカン(ノギテカン) <sup>15)</sup>	1.25 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1~5 (3 週毎)	17*
	ドセタキセル <sup>8)</sup>	70 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1 (3 週毎)	22
	パクリタキセル <sup>4,9)</sup>	180 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1 (3 週毎)	10~30
	パクリタキセル <sup>11,12)</sup>	80 mg/m <sup>2</sup>	静注(毎週)	25~45**
	パクリタキセル <sup>15)</sup>	80 mg/m <sup>2</sup>	静注(毎週)	53***
	リポソーム化ドキシソルビシン <sup>3,5,6)</sup>	40~50 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1 (4 週毎)	10~20
	リポソーム化ドキシソルビシン <sup>15)</sup>	40 mg/m <sup>2</sup>	静注, day 1 (4 週毎)	14*
	ベバシズマブ併用 <sup>15)</sup>	15 mg/kg	静注, day 1 (3 週毎)	
	ベバシズマブ併用 <sup>15)</sup>	10 mg/kg	静注, day 1, 15 (4 週毎)	**
*ベバシズマブ併用群の奏効率 <sup>17)</sup> **国内保険適用外				

上記の追記に付随して 140 頁に文献 17) 追加

17) Poveda AM, Selle F, Hilpert F, Reuss A, Savarese A, Vergote I, et al. Bevacizumab combined with weekly paclitaxel, pegylated liposomal doxorubicin, or topotecan in platinum-resistant recurrent ovarian cancer : analysis by chemotherapy cohort of the randomized phase III AURELIA Trial. J Clin Oncol 2015 ; 33 : 3836-8 (ランダム)【委】

以上

## 正誤表

『卵巢がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライン 2020 年版』第 1 刷 (2020 年 8 月 30 日発行) に誤りがございました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

2020 年 10 月 5 日

金原出版株式会社

## 記

頁	訂正箇所	誤	正
96	15 行目	それぞれ中央値で <u>24.4</u> カ月, <u>24.9</u> カ月, <u>25.3</u> カ月	それぞれ中央値で <b>17.7</b> カ月, <b>20.8</b> カ月, <b>21.0</b> カ月

以上