

正誤表

雑誌「皮膚科の臨床」第65巻13号（2023年12月号）に誤りがございました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

2024年1月

金原出版株式会社

記

頁	訂正箇所	誤
2068	図2 図中文字	<p>疼痛出現 Day -7 初診 Day 1 入院 Day 4 Day 8 Day 11 退院 Day 15</p> <p>アメナメビル 400 mg/日</p> <p>アシクロビル 750 mg/日</p> <p>アセトアミノフェン 1,800 mg/日 2,400 mg/日</p> <p>プレガバリン 25 mg/日 50 mg/日 100 mg/日</p> <p>ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 (イノロトロピン[®]錠4単位) 4錠/日</p> <p>左C2領域に水疱/紅斑 → 右Th4領域および両胸部や腋窩等に小水疱が散在 → 小水疱の新生なく痂皮化</p>
		正
		<p>イノロトロピンをノイロトロピンに修正した。</p> <p>疼痛出現 Day -7 初診 Day 1 入院 Day 4 Day 8 Day 11 退院 Day 15</p> <p>アメナメビル 400 mg/日</p> <p>アシクロビル 750 mg/日</p> <p>アセトアミノフェン 1,800 mg/日 2,400 mg/日</p> <p>プレガバリン 25 mg/日 50 mg/日 100 mg/日</p> <p>ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 (ノイロトロピン[®]錠4単位) 4錠/日</p> <p>左C2領域に水疱/紅斑 → 右Th4領域および両胸部や腋窩等に小水疱が散在 → 小水疱の新生なく痂皮化</p>

以上